CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Traitement parodontal

CABINET DENTAIRE DE L'OBIOU

Traiter l'infection des gencives et de l'os, puis la maintenir sous contrôle.

LE TRAITEMENT

- La maladie parodontale est une infection, due aux bactéries, de la gencive et de l'os qui entourent les dents. Sans traitement, elle conduit au déchaussement, à la mobilité, puis à la perte des dents.
- Le traitement débute par une phase initiale de désinfection : détartrage et surfaçage des racines, en 1 à 2 séances. En cas de gêne, ils peuvent être réalisés sous anesthésie locale ponctuelle.
- Une réévaluation a lieu 2 à 3 mois plus tard pour contrôler la cicatrisation.

PHASE CHIRURGICALE ÉVENTUELLE

- Si des zones localisées restent infectées après la phase initiale, une chirurgie peut être proposée. Elle donnera lieu à un nouveau plan de traitement, avec une information et un accord distincts.

LES CAUSES À CORRIGER

- Tabac, diabète à équilibrer, alimentation, mode de vie, stress : ces facteurs seront discutés en consultation avec le dentiste.
- Si ces causes sont corrigées et l'hygiène maintenue, le traitement a de grandes chances de réussir. Sinon, la maladie risque de récidiver.

SUITES POSSIBLES

- La gencive, en guérissant, se resserre : elle peut remonter (récession) et laisser apparaître la racine, ou laisser des espaces entre les dents (« trous noirs ») où les aliments se coincent.
- Une sensibilité au chaud, au froid ou au brossage est fréquente, mais temporaire.
- Saignement, gonflement et gêne modérés peuvent persister quelques jours ; une mobilité dentaire transitoire est possible.
- L'anesthésie peut laisser un engourdissement passager ; allergie et atteinte nerveuse restent exceptionnelles.
- Ces effets sont habituels : la gencive guérit, ce n'est pas un échec.

VOS ENGAGEMENTS

- Vous suivez les recommandations données lors de la séance initiale : brossage 2 fois par jour, brossettes interdentaires, fil dentaire si besoin, et tous les moyens utiles à un nettoyage parfait.
- Vous venez aux séances de maintenance, tous les 3 à 6 mois, à vie : elles conditionnent la durée des résultats.

Consultez sans attendre : saignement persistant, gencive gonflée ou douloureuse, abcès, dent mobile.

Je reconnais avoir reçu ces informations et pu poser mes questions. Je donne mon consentement au traitement parodontal.

PATIENT / REPRÉSENTANT LÉGAL	PRATICIEN
Nom : ……	Docteur : ……
Date : ……	Date : ……
Signature précédée de « Lu et approuvé »	
Signature :	Signature :